

Nikkho-vac®

antígenos mistos

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução oral (gotas). Embalagem contendo frasco com 15 ml.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada ml contém:

proteínas de substâncias inaláveis	2,50 mcg
proteínas de substâncias alimentares	7,50 mcg
antígenos de bactérias das vias respiratórias (em proteínas, correspondentes a 5 bilhões de germes)	8,00 mcg
veículo q.s.p.	1 ml

excipientes: cloreto de sódio, glicerina, timerosal e água.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

NIKKHO-VAC® destina-se ao tratamento dessensibilizante das alergias alimentares, respiratórias e cutâneas e como imunostimulante. **NIKKHO-VAC®** deve ser guardado na sua embalagem original, ao abrigo do calor excessivo (temperatura superior a 40°C), umidade e luz solar direta. Nestas condições, este medicamento possui prazo de validade a partir da data de fabricação (vide embalagem externa). Este, como qualquer outro produto, não deve ser usado, após vencido o prazo de validade ou caso suas características físicas estejam alteradas. Ao comprar um medicamento, verifique se a embalagem está íntegra. **NIKKHO-VAC®**, assim como qualquer outro medicamento, não deve ser utilizado durante a gravidez e amamentação, a não ser sob estrita orientação médica. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu término. Para que o tratamento com **NIKKHO-VAC®** forneça os resultados esperados, siga a orientação do seu médico, respeitando sempre o modo de usar, os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento, sem o conhecimento do seu médico. Não desaparecendo os sintomas, retorne ao seu médico. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Não há restrições quanto à alimentação ou outra medicação que necessite ser utilizada junto com **NIKKHO-VAC®**. Mesmo assim, informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

Medidas recomendadas para que o paciente alérgico não seja prejudicado durante o tratamento dessensibilizante com **NIKKHO-VAC®**:

1. Evitar o uso de quadros, cortinas, tapetes e móveis estofados de tecidos, que constituem depósitos de poeira;
2. Evitar o contato com animais domésticos cujos pêlos e penas são reservatórios de alérgenos;
3. Manter a residência, principalmente o dormitório, bem ventilada, limpa e seca. Usar um desumidificador ou uma lâmpada acesa embaixo ou próximo à cama, para evitar o excesso de umidade;
4. Evitar ceras, inseticidas, espirais contra insetos, tintas, perfumes e desodorantes domiciliares;
5. Todos os travesseiros e colchões do dormitório do paciente alérgico deverão ser de espuma de borracha ou revestidos com plástico;
6. Não usar roupas de lã ou felpudas. Dar preferência a tecidos de algodão e linho;
7. Evitar o manuseio de vassouras, espanadores, livros e guardados antigos empoeirados e mofados;
8. Praticar esportes (natação) ou fazer exercícios respiratórios ao ar livre.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NIKKHO-VAC® é um dessensibilizante oral à base de antígenos protéicos mistos, extraídos de alimentos, de substâncias inaláveis e de microorganismos das vias respiratórias. É uma preparação original, uma vez que utiliza a via sublingual, evitando os inconvenientes da via parenteral. Os antígenos protéicos do produto não sofrem destruição em presença das enzimas salivares e são bem absorvidos. A dessensibilização é obtida, administrando-se doses apropriadas dos extratos antigênicos, resultando em uma maior tolerância ou criando um estado de refratariedade do organismo, quando em contato com agentes alergênicos.

INDICAÇÕES

NIKKHO-VAC® está indicado para o tratamento dessensibilizante das alergias resultantes da exposição aos fungos do ar, à poeira, aos alimentos e aos germes das vias respiratórias.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Durante a gravidez e lactação, o produto deve ser utilizado sob estrita orientação médica. Como qualquer outro medicamento, não se recomenda sua utilização no primeiro trimestre da gravidez.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento, não foram observadas interações com outros medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS

Raramente, podem ocorrer reações de hipersensibilidade. Dependendo do grau de intensidade dessa reação, deve-se reduzir a dose ou, até mesmo, suspender o seu uso.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Adultos: 6 gotas, duas vezes ao dia, por via sublingual.

Crianças até 10 anos: metade da dose de adultos, a critério médico.

Para maior absorção e melhor efeito, conservar a medicação na boca por alguns minutos, antes de engolir. A terapêutica deve ser mantida até a dessensibilização e depois espaçada, progressivamente, a cada 3 dias, a cada 7 dias e assim sucessivamente, de acordo com o médico.

SUPERDOSAGEM

Até o momento, não existem relatos de casos de superdosagem.

PACIENTES IDOSOS

Não há advertências ou recomendações especiais, sobre o uso do produto em pacientes idosos.

Reg. MS nº 1.0014.0048

Farm. Responsável: Dra. Lílian Maria Maia Fiuza – CRF/RJ nº 8065

QUÍMICA E FARMACÊUTICA NIKKHO DO BRASIL Ltda.

Rua Jaime Perdigão, 431/445 — Ilha do Governador

Rio de Janeiro — RJ — BRASIL

C.N.P.J. 33.517.558/0001-06

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 282 9911

INDÚSTRIA BRASILEIRA



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: VIDE EMBALAGEM EXTERNA.